



SANTIAGO, 10 de Junio de 2017

CERTIFICADO

Fundación Instituto Nacional de Heridas, Rut 65.729.470-5, con domicilio en Avenida Rancagua N° 509, Providencia, certifica que en nuestra Institución se han evaluado los insumos médicos Fucidin en crema y ungüento; Fucidin Intertul, Fucidin H y Fucicort crema, del Laboratorio LEO Pharma A/S, comercializados en Chile por la empresa **Deutsche Pharma S.A.** Dichos productos tienen certificación y autorización del ISP, bajo los registros sanitarios que se señalan a continuación: Fucidin Crema N° Registro F-6653/15, Fucidin Intertul apósito N° Registro F-6652/15, Fucidin Intertul apósito medicado N° Registro B-2655/16, Fucidin Ungüento N° Registro F-6651/15, Fucidin-H crema N° Registro B-796/15 y Fucicort crema, N° Registro F-11389/16, cuya casa matriz está en Dinamarca.

Fucidin contiene ácido Fusídico, compuesto más importante del grupo de los fusidanos, los que son producidos por hongos, cuyas propiedades son bacteriostáticas, inhibiendo la síntesis proteica bacteriana que evita el turnover del factor de elongación G del ribosoma. Tiene efecto contra bacterias Gram positivas, incluyendo especies de Staphylococcus y Corynebacterias. Tiene propiedades lipofílicas e hidrofílicas, lo que permite la penetración a la piel intacta o dañada, hasta el tejido subcutáneo. No se inactiva con costra, pus, ni sangre. En Chile existe en diferentes presentaciones:

Las características de Fucidin: Efectividad frente a bacterias Gram +; tiene actividad bacteriostática que permite mantener el equilibrio de la flora normal de la piel; regula el proceso inflamatorio cuando hay colonización por S. aureus; menor desarrollo de resistencia bacteriana y sin presencia de resistencia cruzada; y no se inactiva con pus y sangre.

Fucidin 2% crema: contiene 20 mg./g de ácido fusídico, más excipientes: butilhidroxianisol, alcohol cetílico, glicerol, parafina líquida y blanca, silicona, sorbato de potasio y polisorbato. En Chile existe la presentación de 15 gramos.

Fucidin 2% ungüento: contiene 20 mg./g de ácido fusídico, más excipientes: alcohol cetílico, lanolina anhidra, parafina blanca, tocoferol y butilhidroxitolueno. En Chile existe la presentación de 15 gramos.

Fucidin H: contiene 20mg./g de ácido fusídico, más 10 mg de hidrocortisona, más excipientes: butilhidroxianisol, alcohol cetílico, glicerina, parafina líquida y blanca. En Chile existe la presentación de 15 gramos.

Fucicort: contiene 20mg./g de ácido fusídico, más 1 mg de betametasona más excipientes: parafina blanca y líquida, alcohol cetosteárico, macrogol, sodio dihidrógeno, clorocresol e hidróxido de sodio. En Chile existe la presentación de 15 gramos.

Fucidin Intertul: tull tipo gasa estéril impregnada con 1,5 gramos de fusidato de sodio al 2% más excipientes: alcohol cetílico, lanolina, parafina blanca y líquida, protegida por dos hojas de pergamino estéril, en un sobre sellado de papel aluminio que contiene 10 unidades individuales de tull impregnado con Ácido Fusídico, en tamaño de 10X10cm.

Según lo observado en pacientes con patología de úlcera de pie diabético, úlcera venosa, úlcera por presión, úlceras isquémicas y herida quirúrgica, en nuestra Institución y en los Pilotos “Implicancia Económica en Pacientes con Úlceras Venosa, en la Atención Primaria de Salud”, los que se realizan en las ciudades de Castro, Coquimbo y Santiago, las recomendaciones del INH son:

Aplicación:

1. Limpieza de la piel: En pacientes con dermatitis, asear la piel con jabón Ph 5 o neutro, utilizar clorhexidina jabonosa al 2% una vez a la semana. En ambos casos, enjuagar prolijamente con agua tibia o solución fisiológica tibia antes de aplicar el producto. En pacientes con eczema, solo lavar con solución fisiológica y en caso de necesitar un emoliente, utilizar un jabón ph 5 y enjuagar abundantemente con solución fisiológica tibia.
2. Las distintas presentaciones de Fucidin pueden ser utilizadas directamente sobre la lesión a tratar y también en la piel circundante de heridas y úlceras crónicas. La presentación Fucidin Intertul puede ser utilizada como apósito primario o secundario.
3. Aplicar el producto según esquema adjunto (anexo 1).

Indicación: Estos productos deben aplicarse por personal entrenado, quién debe realizar una evaluación acuciosa de las características de la piel circundante y de la lesión (herida, úlcera, quemadura), solicitando ayuda de un especialista si presentara dudas de su uso, o al aplicar productos con betametasona o hidrocortisona.

Precauciones: Recordar que el ácido fusídico no debe emplearse con quinolonas, ya que las antagoniza.

En conclusión, **Fucidin** es un producto altamente recomendado en pacientes portadores de heridas, quemaduras y úlceras de pie diabético, venosas, isquémicas y por presión. También está recomendado en pieles con dermatitis, eczemas y algunas infecciones de la piel (impétigo, acné, foliculitis, furúnculos, paroniquia).

Se extiende el presente certificado después de un año de evaluación en nuestra Institución y de 3 meses en los Cesfam de Castro, Coquimbo y Recreo de Santiago.

Atentamente,



www.inheridas.cl

Anexo N° 1: Indicaciones por presentación

Insumo	Indicaciones	Tipos de patología	Indicaciones de uso	Tiempo máximo de uso
Fucidin crema	Infecciones cutáneas de piel macerada o normal	impétigo, furúnculos, paroniquia, hidradenitis, lesiones dérmicas de la zona perilesional de una herida o úlcera Se puede utilizar en cara	Lesiones sin apósitos: 2 a 3 veces al día Lesiones con apósitos: aplicar 2 a 3 veces por semana, protegiendo el producto con Fucidin Intertul	7 días diariamente, 3 semanas cuando la piel esta vendada
Fucidin ungüento	Infecciones cutáneas de piel seca o descamada	impétigo, foliculitis, paroniquia, hidradenitis, lesiones dérmicas de la zona perilesional de una herida o úlcera No se recomienda utilizar en cara	Lesiones sin apósitos: 2 a 3 veces al día Lesiones con apósitos: aplicar 2 a 3 veces por semana, protegiendo el producto con Fucidin Intertul	7 días diariamente, 3 semanas cuando la piel esta vendada
Fucidin H	Dermatopatías inflamatorias con o sin infección, en pacientes menores de 14 años	eczema atópico, eczema discoide, eczema por estasis, dermatitis seborreicas, dermatitis por contacto, psoriasis Se puede utilizar en cara	Lesiones sin apósitos: 2 a 3 veces al día Lesiones con apósitos: aplicar 2 a 3 veces por semana, protegiendo el producto con Fucidin Intertul	Máximo 10 días
Fucicort	Dermatopatías inflamatorias con o sin infección, en pacientes adolescentes, adultos y adultos mayores	eczema atópico, eczema discoide, eczema por estasis, dermatitis seborreicas, dermatitis por contacto, psoriasis No se recomienda utilizar en cara	Lesiones sin apósitos: 2 a 3 veces al día Lesiones con apósitos: aplicar 2 a 3 veces por semana, protegiendo el producto con Fucidin Intertul	Máximo 15 días
Fucidin Intertul	Heridas o úlceras Como apósito primario Como apósito secundario	Heridas o úlceras Tipo 1 o Tipo 2, Quemaduras Tipo A, úlcera del pie diabético, úlceras por presión, úlceras venosas Grado 1 y 2	Cambiar cada 3-4 días Si se usa como secundario, el primario indicara la frecuencia de cambio	Hasta 30 días

Fuente: Fundación Instituto Nacional de Heridas